

大豆施肥防除体系 (10aあたり)

施肥体系

	肥料名	施肥量	備考
基肥	完熟堆肥	2 t	
	五つ星高度化成372 五つ星高度化成444 エコエコ500 ※いずれかを施用	0~20kg	転換年数により調整が必要
追肥	尿素	10~20kg	各圃場により調整が必要

転換年数1~2年：N成分0~1.5kg 連作3年以上：N成分2~3kg 野菜後：無肥料

防除体系

使用時期	病虫害名	薬剤名	倍率(備考)
播種時	鳥害、紫斑病	キヒゲンR2フロアブル	種子1kgに対して20ml塗沫
〃	アブラムシ、タネバエ、ネキリムシ、ハムシ	クルーザーFS30	種子1kgに対して6ml塗沫
〃	アブラムシ、タネバエ、ネキリムシ、ハムシ、茎疫病	クルーザーMAXX	種子1kgに対して8ml塗沫
7月下旬~8月上旬	ウコンノメイガ	プレバソンフロアブル5	4,000倍
		トレボン乳剤	1,000倍
8月(着莢期)	ダイズサヤタマバエ	トレボン乳剤	1,000倍
		スタークル粉剤DL	3kg
8月下旬~9月上旬	紫斑病	ファンタジスタフロアブル	1,000~2,000倍
		プランダム乳剤	3,000~5,000倍
		ベルコート水和剤	1,000倍
	マメシンクイガ	パーマチオン水和剤	2,000~3,000倍
		アグロスリン乳剤	2,000倍
		アディオン乳剤	3,000倍