

メロン病害虫防除薬剤使用例

病名・害虫	薬 剤 名	倍 率	使用時期	総使用回数	備 考
キンカク病	ロブラール水和剤	1,000倍	収穫前日まで	4回以内	
つる枯病	ダコニール 1000	1,000倍	収穫3日前まで	5回以内	予防剤として使用。
	ロブラール水和剤	1,000倍	収穫前日まで	4回以内	
	アミスター20フロアブル	2,000倍	収穫前日まで	4回以内	
	トップジンM水和剤	1,500倍～ 2,000倍	収穫前日まで	3回以内	カスミンボルドーとの混用は、ポリオキシソールALを使用して下さい。トップジンMは、使用出来ません。
べと病	ダコニール 1000	700倍～ 1,000倍	収穫3日前まで	5回以内	予防剤として使用。
	リドミルゴールドMZ	1,000倍	収穫7日前まで	3回以内	べと病が確認されたら、散布する。
	パレード20フロアブル	2,000倍～ 4,000倍	収穫前日まで	3回以内	
	クプロシールド	1,000倍～ 2,000倍	—	—	予防剤として使用。
斑点細菌病	Zボルドー	500倍	—	—	予防剤として使用。
	カスミンボルドー	1,000倍	収穫3日前まで	5回以内	
アブラムシ	アディオソール乳剤	2,000～ 3,000倍	収穫前日まで	5回以内	アブラムシ・ハダニ類の予防的防除は、経費の無駄になります。常に圃場を観察し、発生が確認されたら散布する。
	ウララ D F	2,000～ 4,000倍	収穫前日まで	2回以内	
	ヨーバルフロアブル	2,500～ 5,000倍	収穫前日まで	2回以内	
ハダニ	ピラニカ E W	2,000～ 3,000倍	収穫3日前まで	1回	
オオタバコガ	フェニックス顆粒水和剤	2,000～ 4,000倍	収穫前日まで	2回以内	

※漬物用ウリは別登録になります。