

# ミニトマト施肥、病害虫防除体系

## 1. 施肥体系 (施肥基準 50坪あたり)

肥料名	施肥量	備考
コージくん5号	30kg	基肥
コージくん本生	30kg	
いわい有機	20kg	
グアノ	20kg	
天然マダカル	40kg	
畑のカルシウム	20kg	
サンエーヨー484	20kg	追肥
液肥1号	24kg	
千代田化成	20kg	

## ミニトマト病害虫防除薬剤使用例

### ●使用薬剤

病害虫名	薬剤名	倍率	使用時期	総使用回数
葉カビ病 灰色カビ病	カリグリーン	800倍	収穫前日まで	なし
	ベルクート水和剤	6,000倍	収穫前日まで	2回以内
	ゲッター水和剤	1,500倍	収穫前日まで	3回以内
すすかび病	ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000~3,000倍	収穫前日まで	3回以内
	トリフミン水和剤	3,000倍	収穫前日まで	5回以内
灰色カビ病	フルピカフロアブル	2,000~3,000倍	収穫前日まで	4回以内
	カンタスDF	1,000倍	前日	3回以内
斑点病	ロブラール水和剤	1,000倍	収穫前日まで	3回以内
	アフエットフロアブル	2,000倍	収穫前日まで	3回以内
	ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000倍	収穫前日まで	3回以内
苗立枯病	モンカット水和剤	500~1,000倍	播種時~子葉展開時	1回
アブラムシ	アドマイヤー顆粒水和剤	5,000~10,000倍	収穫前日まで	2回以内
コナジラミ	ダントツ粒剤	1~2g/株	定植時(植穴)	1回
	モスピラン水溶剤	2,000倍	収穫前日まで	3回以内
アザミウマ類・アブラムシ・コナジラミ	ベストガード水溶剤	1,000倍	収穫前日まで	3回以内
	コテツフロアブル	2,000倍	収穫前日まで	3回以内
ミカンキイロアザミウマ	ディアナSC	2,500~5,000倍	収穫前日まで	2回以内
	アーデント水和剤	1,000倍	収穫前日まで	2回以内
	ダントツ粒剤	1~2g/株	定植時(植穴)	1回
ハモグリバエ・アブラムシ	ダントツ水溶剤	2,000~4,000倍	収穫前日まで	3回以内
	アフアーム乳剤	2,000倍	収穫前日まで	5回以内
ハモグリバエ	アーデント水和剤	1,000倍	収穫前日まで	2回以内
	フェニックス顆粒水和剤	2,000倍	収穫前日まで	2回以内
	ディアナSC	2,500~5,000倍	収穫前日まで	2回以内
オオタバコガ	アニキ乳剤	2,000倍	収穫前日まで	3回以内
	コテツフロアブル	2,000倍	収穫前日まで	3回以内
	ダニトロン	1,000倍	収穫14日前まで	3回以内
	コロマイト	1,500倍	収穫前日まで	2回以内
ダニ類	コテツフロアブル	2,000倍	収穫前日まで	3回以内
	アニキ乳剤	2,000倍	収穫前日まで	3回以内
	アフアーム乳剤	2,000倍	収穫前日まで	5回以内
	D-D (97%)	15~20ℓ/10a	作付10~15日前	1回
ネコブセンチュウ	ネマトリンエース粒剤	15~20kg/10a	定植前	1回

### ●散布例

散布時期	使用薬剤	倍率	適用
7月上旬(育苗期間中)	ベストガード水溶剤	1,000倍	アブラムシ他害虫
7月下旬	コテツフロアブル	1,000倍	アザミウマ類
8月下旬	カリグリーン	800倍	葉カビ・灰色カビ
	ボトキラー水和剤	1,000倍	灰色カビ
9月上旬	ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000倍	葉カビ・灰色カビ・斑点
	モスピラン水溶剤	2,000倍	コナジラミ・アザミウマ類
9月中旬	ロブラール水和剤	1,000倍	灰色カビ・斑点病
	トリフミン水和剤	3,000倍	すすかび病
9月下旬	ロブラール水和剤	1,000倍	灰色カビ・斑点病
	ゲッター水和剤	1,500倍	葉カビ・灰色カビ
	ロブラール水和剤	1,000倍	灰色カビ・斑点病

※上記は散布例ですので、その時期に合わせた防除を心がけてください。