

アスパラガス (施肥基準10a当)

◎標 準

肥料名	施肥量	備考
堆肥	5,000kg	
炭酸苦土石灰(粒)	140kg	(旧苦土エース)
B M 苦土重焼燐	40kg	
燐加安 A 929	100kg	
液肥 1 号	48kg	追肥

◎標 準 2

肥料名	施肥量	備考
堆肥	5,000kg	
炭酸苦土石灰(粒)	140kg	(旧苦土エース)
B M 苦土重焼燐	40kg	
イオウコート	120kg	
五つ星高度化成444	100kg	

アスパラガス病害虫防除薬剤使用例

病害虫名	薬剤名	倍率	総使用回数	効果	備考
斑点病	ラリー水和剤	4,000倍	2回以内	予防・治療	
茎枯病	クプロシールド	1,000倍	—	予 防	銅剤
斑点病	メジャーフロアブル	2,000倍	3回以内	予防・治療	
褐斑病 茎枯病 斑点病	ダコニール 1000	1,000倍	4回以内	予 防	T P N
	ベルコート水和剤	1,000倍	5回以内	予 防	
	ファンタジスタ顆粒水和剤	3,000倍	3回以内	予防・治療	
	アミスター20フロアブル	2,000倍	4回以内	予防・治療	薬害注意
害 虫	シグナム W D G	1,500倍	2回以内	予防・治療	
	エルサン乳剤	1,000倍	2回以内	ジュウシホシクビナガハムシ	
	ダントツ水溶液	2,000~4,000倍	3回以内	アブラムシ・ジュウシホシクビナガハムシ	
	スタークル水溶剤	2,000倍	3回以内	アザミウマ類、カメムシ類	
	アディオン乳剤	2,000~3,000倍	3回以内	ジュウシホシクビナガハムシ・ヨトウムシ	
	ランネート45 D F	1,000倍	1回以内	ネギアザミウマ・ナメクジ類	
	アフーム乳剤	2,000倍	2回以内	オオタバコガ・ヨトウ類	
	フェニックス顆粒水和	2,000~4,000倍	2回以内	オオタバコガ・ヨトウ類	
葉面散布 (リン酸系)	ディアナ S C	2,500~5,000倍	2回	アザミウマ類、ハスモンヨトウ	
	P S ダ ッ シ ュ	1,000倍	—		
	トップスコアリン	1,000倍	—		
除 草 剤	リンクエース	1,000倍	—		
	トレファノサイド乳剤	200~300cc	1回以内		萌芽前
	センコル水和剤	100~150 g	1回以内		萌芽前~萌芽始期
	ナブ乳剤	150~200cc	1回以内		イネ科雑草3~5葉期
展着剤	バスタ液剤	300~500cc	2回以内		収穫前日まで
	アプローチ B I	1,000倍	—		