

みょうが施肥防除体系

●施肥基準／10aあたり

項目	肥料名	施肥量	備考
基肥	スーパーみょうが	40kg	各圃場により調整が必要
	輸入溶燐(粒)	60kg	〃
	炭酸苦土石灰(粒) (旧苦土エース粒)	100kg	P Hの低い圃場は多めに使用
追肥	けい酸加里プレミアム34	40kg	本葉6～7葉期
	N K 23	20kg	生育に合わせて施用、ただし本葉8枚まで

●使用農薬体系

散布時期	病名	使用薬剤名	倍率
播種前	根茎腐敗病	ランマンフロアブル	200倍
生育期	根茎腐敗病	ランマンフロアブル	500倍
4月上旬～6月上旬	根茎腐敗病	ユニフォーム粒剤	18kg
6月中旬	葉枯病	ダコニール1000	1,000倍
6月下旬	軟腐病	Zボルドー水和	500倍
発生初期	アオムシ・オオタバコガ	トアローフロアブルCT	1,000倍

- ① ダコニール1000は発病初期～収穫14日前までに実施。
- ② 根茎腐敗病は高温・多雨、日当たりの良い場所に発生しやすいため、敷きわらを厚めにして地温上昇を避ける。
- ③ ランマンフロアブルは播種前の場合、200倍で浸漬。生育期の場合500倍で土壌灌注。