

# そら豆施肥防除体系

## ●施肥体系（10aあたり）

| 肥料名                   | 基肥      | 追肥   | 備考   |
|-----------------------|---------|------|--|
| 牛糞完熟堆肥                | 3,000kg |      | 全面施用（土づくり）   |
| 炭酸苦土石灰（粒）<br>（旧苦土エース） | 140kg   |      |  |
| 苦土重焼燐                 | 40kg    |      |  |
| LP苦土安2号               | 80kg    |      | 畝施肥（基肥）  |
| ノルチッソ                 | 20kg    |      |  |
| 高度化成372               | 20kg    |      |  |
| 燐硝安加里 S 646           |         | 40kg | バラ播き散布<br>1回目：マルチ除去時 20kg/10a<br>2回目：花おさまり期 20kg/10a<br>※マルチ除去前の液肥灌注も有効<br>※生育状況により追加施肥を実施 |

## ●病害虫防除

| 薬剤名          | 対象                 | 倍率、使用量       | 使用時期 | 使用回数  |
|--------------|--------------------|--------------|------|-------|
| ロブラール水和      | 赤色斑点病              | 1,000倍       | 前日まで | 播種後3回 |
| アミスター20フロアブル | さび病                | 2,000倍       | 収-3日 | 3回    |
| アドマイヤー1粒     | アブラムシ              | 2g/植穴        | 定植時  | 定植時1回 |
| フェニックス顆粒水和   | ハスモンヨトウ            | 2,000倍       | 収-前日 | 2回    |
| プレバソンフロアブル   | ハモグリバエ類            | 1,000~2,000倍 | 収-前日 | 3回    |
| ディアナSC       | ハスモンヨトウ<br>ハモグリバエ類 | 2,500倍       | 収-前日 | 2回    |
| スミチオン乳       | アブラムシ              | 1,000~2,000倍 | 収-3日 | 4回    |
| アディオーン乳      | アブラムシ              | 3,000倍       | 収-7日 | 3回    |
| エルサン乳        | アブラムシ              | 1,000~2,000倍 | 収-7日 | 2回    |