

初夏どりキャベツ施肥防除体系

1. 施肥体系

	肥料名	施肥量(10aあたり)	備考
基肥	牛糞完熟堆肥	3,000kg	本畑全面施用
	炭酸苦土石灰(粒)(旧苦土エース)	200kg	本畑全面施用
	石灰窒素(粒)	60kg	本畑全面施用
	よ　　う　　り　　ん	60kg	本畑全面施用
	スターホルム33号	120kg	本畑全面施用
追肥	園芸化成403	60kg	30kgずつ2回分

2. 病害虫防除

●使用薬剤

病害虫名	薬剤名	倍率(使用量)	使用時期	備考	総使用回数	
除草剤	フィールドスターP乳剤	1,333~2,000倍	定植後10日まで	全面土壌散布	1回	
	プリグロックスL	150倍	収穫30日前まで	雑草茎葉散布	3回以内	
根こぶ病	オラクル粉剤	20~30kg	定植前	全面土壌混和	2回以内	
菌核病	ロブラール水和剤	1,000倍	収穫7日前まで	茎葉散布	4回以内	
	トップジンM水和剤	1,000~1,500倍	収穫3日前まで		2回以内	
菌核病 株腐れ病	アミスター20フロアブル	2,000倍	収穫7日前まで		4回以内	
	セイビアーフロアブル	1,000倍	収穫3日前まで		3回以内	
	カンタスドライフロアブル	1,500倍	収穫7日前まで		2回以内	
	アフエットフロアブル	2,000倍	収穫前日まで		3回以内	
株腐れ病 黒腐れ病 軟腐病	バリダシン液剤	800倍	収穫7日前まで		5回以内	
軟腐病 黒腐病 べと病	ヨネポン水和剤	500倍	収穫7日前まで		5回以内	
ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6kg	定植時		土壌表面散布	土壌表面散布
コナガ	パダンSG水溶剤	1,500倍	収穫14日前まで		茎葉散布	4回以内
	ノーモルト乳剤	2,000倍	収穫7日前まで	2回以内		
アブラムシ	アデオン乳剤	2,000倍	収穫3日前まで	5回以内		
コナガ アオムシ ヨトウムシ	スピノエース顆粒水和	2,500~5,000倍		3回以内		
	ゼンターリ顆粒水和	1,000~2,000倍	収穫前日まで	—		
	フェニックス顆粒水和	2,000~4,000倍	収穫前日まで	3回以内		
	プレバソンフロアブル5	2,000倍	収穫前日まで	3回以内		
アザミウマ類	デアアナSC	2,500~5,000倍	収穫前日まで	2回以内		

3. 葉面散布

資材名	倍率	使用時期	効果
PSダッシュME	1,000~2,000倍	生育期(薬剤散布時)	根張り促進、肥料成分の吸収促進
ファイトカル	500倍	生育期(薬剤散布時)	縁腐れ・芯腐れ予防、カルシウム補給

※薬剤に展着・浸透性を持たせるため、薬剤散布時に混用する。

※ヨネポン水和剤のように混用できない薬剤もあります。

使用に関して不明な点は指導員に確認してください。